

**PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON OZONO PARA LESIONES
LIGAMENTOSAS SINOVIALES:
OSTEOMELITIS, OSTEOARTROSIS GENERALIZADA Y OSTEOPOROSIS**

Copyright © Aepromo, abril 2016

All rights reserved

Nota Bene: Los protocolos de actuación son guías que AEPROMO pone a disposición de todos sus asociados, con el ánimo de que sean referentes en el quehacer médico diario cuando se utilice la ozonoterapia con pacientes.

Es al profesional de la salud (médicos, odontólogos, veterinarios y podólogos - en las áreas para las cuales su profesión y legislación vigente se los permite) a quien le compete, con sus estudios, conocimientos y experiencia, asumir profesionalmente cómo aplica la ozonoterapia con sus pacientes. Aunque los protocolos son guías y referentes para sus miembros, AEPROMO los invita a que basen su práctica diaria en los mismos.

Los protocolos están basados en la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia, ISCO3, 2ª. ed., 2015, 50 páginas.

<http://aepromo.org/declaracion-de-madrid-sobre-ozonoterapia-2a-edicion/>

El contenido de los protocolos y las materias que tratan, son objeto de actualizaciones basadas en la experiencia médica y las investigaciones científicas. AEPROMO hace un llamado a todos sus asociados para que con sus aportes, sugerencias, experiencias y conocimientos podamos ir mejorándolos.

Pueden combinarse las siguientes técnicas sistémicas con las infiltraciones locales:

En caso de osteomielitis use concentraciones altas para infiltración, bolsa o administración en campana.

Bolsa o administración en campana: Comience con concentraciones de (80-60-50-30) $\mu\text{g}/\text{NmL}$ de ozono a flujo continuo durante 10 min previamente haber lavado la herida con agua ozonizada.

Aplice aceite ozonizado (Oleosan) de 600 IP

Infiltración de hueso: 40-30 $\mu\text{g}/\text{NmL}$ 5-10 ml de volumen.

Autohemoterapia Mayor (AHTMayor) en 100ml de sangre

| Semana de tratamiento | Concentración O3 (µg/NmL) | Volumen O3 (mL) | Dosis (mg) |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Primera | 15 | 100 | 1.5 |
| Segunda | 20 | 100 | 2.0 |
| Tercera | 25 | 100 | 2.5 |
| Cuarta | 30 | 100 | 3.0 |

A completar 15 sesiones.

Autohemoterapia Menor (AHTMenor) en 5ml de sangre

| Semana de tratamiento | Concentración O3 (µg/NmL) | Volumen O3 (mL) | Dosis (mg) |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Primera | 15 | 5 | 0.075 |
| Segunda | 20 | 5 | 0.10 |
| Tercera | 30 | 5 | 0.15 |
| Cuarta | 35 | 5 | 0.175 |

A completar 15 sesiones.

Vía Rectal

| Semana de tratamiento | Concentración O3 (µg/NmL) | Volumen O3 (mL) | Dosis (mg) |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Primera | 15 | 100 | 1.5 |
| Segunda | 20 | 120 | 2.4 |
| Tercera | 30 | 150 | 4.5 |
| Cuarta | 35 | 150 | 5.2 |

Frecuencia diaria, a completar 20 sesiones, repetir ciclo cada 4-6 meses.