

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON OZONO PARA PSORIASIS

Copyright © Aepromo, abril 2016

All rights reserved

Nota Bene: Los protocolos de actuación son guías que AEPROMO pone a disposición de todos sus asociados, con el ánimo de que sean referentes en el quehacer médico diario cuando se utilice la ozonoterapia con pacientes.

Es al profesional de la salud (médicos, odontólogos, veterinarios y podólogos - en las áreas para las cuales su profesión y legislación vigente se los permite) a quien le compete, con sus estudios, conocimientos y experiencia, asumir profesionalmente cómo aplica la ozonoterapia con sus pacientes. Aunque los protocolos son guías y referentes para sus miembros, AEPROMO los invita a que basen su práctica diaria en los mismos.

Los protocolos están basados en la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia, ISCO3, 2ª. ed., 2015, 50 páginas.

<http://aepromo.org/declaracion-de-madrid-sobre-ozonoterapia-2a-edicion/>

El contenido de los protocolos y las materias que tratan, son objeto de actualizaciones basadas en la experiencia médica y las investigaciones científicas. AEPROMO hace un llamado a todos sus asociados para que con sus aportes, sugerencias, experiencias y conocimientos podamos ir mejorándolos.

Autohemoterapia Mayor (AHTMayor) en 100ml de sangre

Semana de tratamiento	Concentración O ₃ (µg/NmL)	Volumen O ₃ (mL)	Dosis (mg)
Primera	20	125	2.5
Segunda	30	125	3.7
40	40	110	4.4
Cuarta	45	110	4.9
Quinta	50	110	5.5

A completar 15 sesiones.

Autohemoterapia Menor (AHTMenor) en 5mL de sangre

Semana de tratamiento	Concentración O3 (µg/NmL)	Volumen O3 (mL)	Dosis (mg)
Primera	20	5	0.10
Segunda	30	5	0.15
Tercera	35	5	0.175
Cuarta	40	5	0.20
Quinta	45	5	0.22

A completar 15 sesiones.

Vía Rectal

(puede usarse esta vía como única o combinada con AHTMayor o AHTMenor)

Semana de tratamiento	Concentración O3 (µg/NmL)	Volumen O3 (mL)	Dosis (mg)
Primera	25	100	2.5
Segunda	30	120	3.6
Tercera	35	150	5.2
Cuarta	40	150	6.0

Frecuencia diaria, a completar 20 sesiones, repetir ciclo cada 4-6 meses.

Además del tratamiento sistémico se asocian los siguientes métodos:

- Combinar con administración de ozono en bolsa o campana sobre la lesión dérmica a 30 µg/NmL.
- Asociar infiltraciones en las placas, una vez por semana, a razón de 20 µg/NmL
- Volumen a administrar 0.5-1mL de ozono.
- Aplicar diariamente 2 veces al día, aceite ozonizado a 600 y 400 IP.