

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON OZONO PARA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL

Copyright © Aepromo, abril 2016

All rights reserved

Nota Bene: Los protocolos de actuación son guías que AEPROMO pone a disposición de todos sus asociados, con el ánimo de que sean referentes en el quehacer médico diario cuando se utilice la ozonoterapia con pacientes.

Es al profesional de la salud (médicos, odontólogos, veterinarios y podólogos - en las áreas para las cuales su profesión y legislación vigente se los permite) a quien le compete, con sus estudios, conocimientos y experiencia, asumir profesionalmente cómo aplica la ozonoterapia con sus pacientes. Aunque los protocolos son guías y referentes para sus miembros, AEPROMO los invita a que basen su práctica diaria en los mismos.

Los protocolos están basados en la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia, ISCO3, 2ª. ed., 2015, 50 páginas.

<http://aepromo.org/declaracion-de-madrid-sobre-ozonoterapia-2a-edicion/>

El contenido de los protocolos y las materias que tratan, son objeto de actualizaciones basadas en la experiencia médica y las investigaciones científicas. AEPROMO hace un llamado a todos sus asociados para que con sus aportes, sugerencias, experiencias y conocimientos podamos ir mejorándonos.

PARA ADULTOS

Autohemoterapia Mayor (AHTMayor) en 100ml de sangre

Semana de tratamiento	Concentración O ₃ (µg/NmL)	Volumen O ₃ (mL)	Dosis (mg)
Primera	5	50	0.25
Segunda	10	100	1.0
Tercera	15	110	1.6
Cuarta	18	110	1.9
Quinta	20	125	2.5

A completar 15 sesiones.

Autohemoterapia Menor (AHTMenor) en 5ml de sangre

Semana de tratamiento	Concentración O3 (µg/NmL)	Volumen O3 (mL)	Dosis (mg)
Primera	5	5	0.025
Segunda	10	5	0.05
Tercera	15	5	0.75
Cuarta	18	5	0.09
Quinta	20	5	0.1

A completar 15 sesiones.

Vía Rectal

Semana de tratamiento	Concentración O3 (µg/NmL)	Volumen O3 (mL)	Dosis (mg)
Primera	15	100	1.5
Segunda	18	120	2.1
Tercera	20	150	3.0
Cuarta	20	200	4.0

Frecuencia diaria, a completar 20 sesiones, repetir ciclo cada 4 meses.

PARA NIÑOS (solo por vía rectal)

Según edad

Edad: 5 meses-11 meses

Vía Rectal

Semana de tratamiento	Concentración O3 (µg/NmL)	Volumen O3 (mL)	Dosis (mg)
Primera	15	15	0.22
Segunda	18	15	0.27
Tercera	20	20	0.4
Cuarta	20	20	0.4

Frecuencia diaria, a completar 20 sesiones, repetir ciclo cada 4 meses.

Edad: 1 año-3 años

Vía Rectal

Semana de tratamiento	Concentración O ₃ (µg/NmL)	Volumen O ₃ (mL)	Dosis (mg)
Primera	15	20	0.3
Segunda	18	30	0.54
Tercera	20	30	0.6
Cuarta	20	35	0.7

Frecuencia diaria, a completar 20 sesiones, repetir ciclo cada 4 meses.

Edad: 4 años-10 años

Vía Rectal

Semana de tratamiento	Concentración O ₃ (µg/NmL)	Volumen O ₃ (mL)	Dosis (mg)
Primera	15	70	1.05
Segunda	18	100	1.8
Tercera	20	120	2.4
Cuarta	20	120	2.4

Frecuencia diaria, a completar 20 sesiones, repetir ciclo cada 3 meses.

Edad: 11 años-15 años

Vía Rectal

Semana de tratamiento	Concentración O ₃ (µg/NmL)	Volumen O ₃ (mL)	Dosis (mg)
Primera	15	70	1.05
Segunda	18	100	1.8
Tercera	20	120	2.4
Cuarta	20	120	2.4

Frecuencia diaria, a completar 20 sesiones, repetir ciclo cada 4 meses.