

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON OZONO PARA AMIGDALITIS Y SINUSITIS.

**Copyright © Aepromo, abril 2016
All rights reserved**

Nota Bene: Los protocolos de actuación son guías que AEPRIMO pone a disposición de todos sus asociados, con el ánimo de que sean referentes en el quehacer médico diario cuando se utilice la ozonoterapia con pacientes.

Es al profesional de la salud (médicos, odontólogos, veterinarios y podólogos - en las áreas para las cuales su profesión y legislación vigente se los permite) a quien le compete, con sus estudios, conocimientos y experiencia, asumir profesionalmente cómo aplica la ozonoterapia con sus pacientes. Aunque los protocolos son guías y referentes para sus miembros, AEPRIMO los invita a que basen su práctica diaria en los mismos.

Los protocolos están basados en la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia, ISCO3, 2ª. ed., 2015, 50 páginas.

<http://aepromo.org/declaracion-de-madrid-sobre-ozonoterapia-2a-edicion/>

El contenido de los protocolos y las materias que tratan, son objeto de actualizaciones basadas en la experiencia médica y las investigaciones científicas. AEPRIMO hace un llamado a todos sus asociados para que con sus aportes, sugerencias, experiencias y conocimientos podamos ir mejorándonos.

AMIGDALITIS CRÓNICA RECURRENTE

Esquema de tratamiento:

Inyección intratonsilar:

Dosis: 3-5 mL intratonsilar a 10-20 µg/NmL. 4 aplicaciones como promedio / 1 vez por semana. Pincelar con aceite ozonizado de 600 IP

Efectos terapéuticos:

- Negativización de cultivos
- Negativización Antiestreptolisinas

SINUSITIS CRÓNICA

Esquema de tratamiento:

O3 Ótico: Un ciclo de 20 sesiones a [30 µg/NmL] con previa humidificación del pabellón auricular con agua destilada.

Microdosis en puntos de Acupuntura a 10-20 µg/NmL, 1 mL x punto.

Puede añadirse MiAHT 1-2/ semana

Método de Apnea del Dr. E. Fisch:

El paciente deberá realizar una inhalación profunda y permanecer en apnea durante 30 a 60 segundos, mientras se insuflan 5 a 10 mL del gas en ambas fosas nasales mediante un catéter de silicón a una concentración a escala descendente empezando a 20 $\mu\text{g}/\text{NmL}$ y reduciendo conforme el proceso infeccioso vaya cediendo.

Tratamiento sistémico rectal o autohemoterapia mayor.

20 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 100 mL de ozono.

25 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 100 mL de ozono.

30 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 100 mL de ozono.

35 $\mu\text{g}/\text{mL}$, 100 mL de ozono.