

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO CON OZONO PARA ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL INTESTINO: ENFERMEDAD DE CHRON, COLON IRRITABLE, DIVERTICULOSIS

Copyright © Aepromo, abril 2016

All rights reserved

Nota Bene: Los protocolos de actuación son guías que AEPROMO pone a disposición de todos sus asociados, con el ánimo de que sean referentes en el quehacer médico diario cuando se utilice la ozonoterapia con pacientes.

Es al profesional de la salud (médicos, odontólogos, veterinarios y podólogos - en las áreas para las cuales su profesión y legislación vigente se los permite) a quien le compete, con sus estudios, conocimientos y experiencia, asumir profesionalmente cómo aplica la ozonoterapia con sus pacientes. Aunque los protocolos son guías y referentes para sus miembros, AEPROMO los invita a que basen su práctica diaria en los mismos.

Los protocolos están basados en la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia, ISCO3, 2ª. ed., 2015, 50 páginas.

<http://aepromo.org/declaracion-de-madrid-sobre-ozonoterapia-2a-edicion/>

El contenido de los protocolos y las materias que tratan, son objeto de actualizaciones basadas en la experiencia médica y las investigaciones científicas. AEPROMO hace un llamado a todos sus asociados para que con sus aportes, sugerencias, experiencias y conocimientos podamos ir mejorándonos.

Verificar el peso del/la paciente y extraer el volumen de sangre de acuerdo al Volumen de Sangre Circulante (VSC) para evitar alteraciones hemodinámicas. Aplicar la fórmula $\text{peso} \times 1.2 \text{ mL} = \text{volumen de sangre a extraer}$.

Ejemplo: Paciente de 80 Kg $\times 1.2 = 96 \text{ mL}$ de sangre a extraer. En este caso puede redondear a 100mL Aplicar el mismo volumen de gas ozono manteniendo la relación 1:1 a las concentraciones indicadas abajo.

Consultar la Declaración de Madrid sobre la Ozonoterapia, ISCO3, 2ª ed., 2015, 50 pág.
<http://aepromo.org/declaracion-de-madrid-sobre-ozonoterapia-2a-edicion/>

Pueden combinarse las siguientes técnicas:

Autohemoterapia Mayor (AHTMayor) en 100ml de sangre

| Semana de tratamiento | Concentración O3 (µg/NmL) | Volumen O3 (mL) | Dosis (mg) |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Primera | 20 | 100 | 2.0 |
| Segunda | 30 | 100 | 3.0 |
| Tercera | 35 | 100 | 3.5 |
| Cuarta | 40 | 100 | 4.0 |

A completar 15 sesiones.

Autohemoterapia Menor (AHTMenor) en 5ml de sangre

| Semana de tratamiento | Concentración O3 (µg/NmL) | Volumen O3 (mL) | Dosis (mg) |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Primera | 15 | 5 | 0.075 |
| Segunda | 20 | 5 | 0.10 |
| Tercera | 30 | 5 | 0.15 |
| Cuarta | 35 | 5 | 0.175 |
| Quinta | 45 | 5 | 0.225 |

A completar 15 sesiones

Vía Rectal

| Semana de tratamiento | Concentración O3 (µg/NmL) | Volumen O3 (mL) | Dosis (mg) |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| Primera | 15 | 100 | 1.5 |
| Segunda | 20 | 120 | 2.4 |
| Tercera | 30 | 150 | 4.5 |
| Cuarta | 35 | 150 | 5.2 |

Frecuencia diaria, a completar 20 sesiones, repetir ciclo cada 4 meses.

Se aconseja cuidar la flora intestinal. Administrar probióticos.